

## PREPARAZIONE AGO-BIOPSIA PROSTATICA ECOGUIDATA

### PRIMA DELL'ESAME:

- Eseguire i seguenti esami ematici: **Emocromo completo**  
**Tempo Protrombina (PT)**  
**TempoProtrombina parziale (PTT)**  
**Fibrinogeno**

Portare in visione i risultati il giorno dell'esame.

- In caso di terapia anticoagulante (es. Aspirina) consultare i medici del reparto di Radiologia e Diagnostica per Immagini, per valutare la possibilità della sospensione della terapia nei 7 giorni precedenti l'esame. Prima della sospensione è necessario comunque consultare il proprio medico curante.
- **il giorno prima dell'esame assumere una compressa di CIPROXIN 500 mg alle ore 8.00 e una compressa di CIPROXIN 500 mg ore 20.00**  
(sono esclusi i casi in cui vi siano già note allergie specifiche al farmaco per i quali i Pazienti dovranno affidarsi alla consulenza con il proprio medico di famiglia per la sostituzione con altro antibiotico utile a prevenire eventuali infezioni)

### IL GIORNO DELL' ESAME

- Assumere una compressa di CIPROXIN 500 mg alle ore 8.00 e una compressa di CIPROXIN 500 mg ore 20.00
- Eseguire un clistere 2 ore prima della biopsia
- Portare in visione gli esami ematochimici richiesti e tutta la documentazione clinica relativa alla prostata.
- Portare DUE impegnative:  
**1) Agobiopsia prostatica ecoguidata (corredata di diagnosi) codice CUR : 60.11.1**  
**2) Esame istologico di biopsia prostatica (corredata di diagnosi) codice CUR : 91.44.1**

### DOPO L'ESECUZIONE DELL' ESAME

- Continuare l'assunzione di una compressa di CIPROXIN 500 mg alle ore 8.00 e una compressa di CIPROXIN 500 mg ore 20.00 per 4 giorni
- E' possibile che nei giorni successivi all'esame si presentino i seguenti sintomi.
  - a) Presenza di sangue in urine e feci (fino a 6 settimane dopo)
  - b) Presenza di sangue nel liquido seminale
  - c) Febbre
- Se eliminate molti coaguli nelle urine o si presenta difficoltà nella minzione o se la febbre supera i 38° contattare l'Urologo di turno diurno in Ospedale al numero: 06/93298401 oppure 06/932989-0.
- Eventuali terapie anticoagulanti sospese vanno riprese dietro controllo del proprio medico. (normalmente è sufficiente attendere 7 giorni dall'esame).

**"In caso di già note allergie specifiche al farmaco (CIPROXIN) i Pazienti dovranno affidarsi alla consulenza del proprio medico di famiglia per la sostituzione con altro antibiotico utile a prevenire eventuali infezioni".**

